

Per prevenire e contenere gli eventi avversi da vaccino

Se il vaccino fosse preceduto da un'accurata anamnesi ed indagini ematochimiche e strumentali si potrebbe probabilmente ridurre l'incidenza di eventi avversi, attenuarne decisamente la gravità e contenerne la durata. Queste considerazioni si basano su dati scientifici e sull'osservazione di un numero ormai rilevante di pazienti, sia da parte del sottoscritto, che di colleghi che hanno impiegato le molecole scientificamente testate ma non ancora valorizzate in terapia del Metodo Di Bella, di cui la letteratura ha ampiamente documentato lo stretto sinergismo nella prevenzione e terapia sia antinfettiva che antitumorale.

Un'accurata anamnesi pre-vaccinale sarebbe necessaria e indispensabile per limitare i potenziali e non rari effetti avversi a breve o a lungo termine dei vaccini anticovid, integrata da esami relativi all'accertamento di :

patologie metaboliche
allergiche
endocrine
autoimmuni
oncologiche
cardiocircolatorie emo-coagulative pressorie
neurologiche

Esami: Emocromo, azotemia, glicemia, emoglobina glicata , urine, creatinina, VES Reuma test PCR, GOT, GPT, AFP, GGT, bilirubina, ALP, ammoniemia, uricemia, LDH, proteine totali e frazionate, IGE, C3, C4, sideremia, calcemia, elettroliti sierici, ricerca quantitativa di anticorpi IgG anti- Spike S1/S2 SARS- Cov e anticorpi IgM anti-Spike S1/S2 SARS- Cov, IGF1 ,Prolattina, ACTH, Cortisolo.

Se patologie tiroidee: Ft3 Ft4 TSH TRH, anticorpi anti TG anti TPO, Tireoglobulina, Calcitonina, CEA, PTH, ecografia del collo.

Sarebbero utili, particolarmente in presenza di ipertensione, cardiopatie, fibrillazioni, progressi TIA o ictus: ECG con visita cardiologica CPK-MB, PT, PTT, antitrombina III°, D-Dimero, INR, PAT (aggregazione piastrinica, non tutti i laboratori sono attrezzati ma sarebbe particolarmente utile) e soprattutto nei giovani LH, FSH e rispettivi ormoni sessuali, estradiolo nelle donne, testosterone negli uomini, per i non rari eventi avversi da vaccino sia maschile con sterilità, che femminile con aborti e amenorrea .

Sarebbe utile anche un monitoraggio dei valori pressori a orari costanti annotando pressione minima, massima e frequenza. Valori pressori fisiologici riducono la gravità di alterazioni pressorie e possibili ictus da vaccino per interazione di

autoanticorpi prodotti dalla proteina Spike col recettore ACE, che interviene nei meccanismi di regolazione pressoria .

Accertare con l'anamnesi la presenza di malattie autoimmuni, diatesi allergiche, shock anafilattici, malattie congenite e/o ereditarie come: Fattore V di Leiden, alfa 1 Antitripsina, Fibrosi cistica, Corea di Huntington, Distrofia muscolare di Duchenne, Anemia a cellule falciformi, ecc...

Relativamente allo stato di gravidanza accertato o presunto e allattamento, dalla relazione dell'Istituto Superiore di Sanità <https://www.epicentro.iss.it/vaccini/covid-19-target-gravidanza-allattamento> **le donne in gravidanza e allattamento non sono state incluse nei trial di valutazione dei vaccini Pfizer-BioNtech mRNA (Comirnaty), Moderna e AstraZeneca per cui non disponiamo di dati di sicurezza ed efficacia relativi a queste persone.**

Negli ammalati oncologici i potenziali eventi avversi da vaccino possono sommarsi ai danni prodotti dal cancro, ed essere amplificati dalla chemio-radio tossicità complicata dalla cardiotoxicità di anticorpi monoclonali come l'Herceptin e l'angiotossicità indotta dall'Avastin e dal Tamoxifene, prescritto con altre indicazioni. Sia sui pazienti oncologici in remissione, che in terapia, si imporrebbe la massima precauzione, cautela e prudenza per l'assoluta mancanza di studi sia sui vaccini a mRNA, che su quelli a vettore virale, relativi a possibili interferenze con la RT-PCR, gli acidi nucleici, i complessi sistemi enzimatici interattivi che li regolano, come le RNA, DNA-Polimerasi **con possibile effetto cancerogeno immediato o a lungo termine**. Infatti non sono stati studiati gli effetti epigenetici dovuti a siRNA, miRNA ampiamente e chiaramente documentati dalla Dr.ssa Bolgan:- https://drive.google.com/file/d/1bBtm7gh2pgxz0srPkO5Ba_LKDxc-_1kl/view, né le modifiche post-traduzionali né l'interazione sull'espressione, e trascrizione genica, e sui meccanismi di trasduzione. Un dato epidemiologico non trascurabile: dei tanti pazienti in cura con Metodo Di Bella, per l'elevato e documentato effetto **differenziante, immunomodulante antiaggregante del MDB**, NON ABBIAMO PERSO UN SOLO PAZIENTE PER COVID .

Anche se la mia esperienza personale ovviamente ha un valore molto relativo, ho già osservato alcuni casi di aggravamento immediato di pazienti oncologici dopo il vaccino e in qualche altro, di neoplasie fulminanti post vaccino. Raccomanderei vivamente, in base a queste considerazioni assolutamente esenti da qualsiasi conflitto d'interesse finanziario o ideologico, di fare precedere e seguire la vaccinazione degli ammalati oncologici da almeno un mese di terapia MDB ad alte dosi, priva di tossicità.- Nel sito www.metododibella.org dal 21 settembre sarà riportata in prima pagina, alla sezione **Novità e Comunicazioni : Sinergismo antinfettivo e antitumorale di**

molecole MDB-Covid-19 : PREVENZIONE ANTI-VIRALE (documentazione e riscontri bibliografici) la formulazione della ricetta, con tutti i farmaci (non sono integratori) e relativi dosaggi, modalità e tempi di somministrazione, reperibili anche iscrivendosi alla newsletter del sito www.metododibella.org, in prima pagina nel margine superiore alla voce “Iscriviti alla Newsletter”

TERAPIA:

Soluzione di Ac Trans retinoico gr 0,25

Axeroftolo palmitato gr 0,25

Beta carotene gr 1

Alfatocoferile acetato gr 500

Un cucchiaino mattina e sera, a digiuno almeno 15 minuti prima del pasto con 15 gocce di vitamina D, preferibilmente Dediol oppure Atiten

Vitamina C

un cucchiaino da caffè in un bicchiere d'acqua durante il pasto 2 volte al dì , reperibile facilmente su internet senza ricetta . (se gastrite Vitamina C liposomiale almeno 2 gr al dì)

Melatonina biologica idrosolubile (MLT) (Melatonina 12 % Adenosina 51% Glicina 37%)

dai 50 ai 100 mg al giorno. E' particolarmente efficace l'effetto antiaggregante fisiologico, vasoprotettivo della melatonina che contrasta decisamente le complicazioni vascolari e tromboemboliche oltre ad attivare l'immunità con la vitamina C, D e retinoidi. Elevate dosi di MLT sinergiche all'effetto antiaggregante di alte dosi di Vitamina E e immunomodulanti degli altri componenti contengono decisamente la cascata di citochine immunocomplessi e conseguentemente dei fenomeni di sovrvertimento potenzialmente fatale del sistema immunitario. Il recupero fisiologico sia dell'aggregazione piastrinica 4 dell'assetto emocoagulativo che della funzionalità immunitaria consente sempre nella prevenzione, e spesso nella terapia in corso di malattia, di sostituire l'impiego di cortisonici ed eparina.

Lisozima

un cucchiaino da caffè durante il pasto 2 volte al dì (reperibile facilmente su internet senza ricetta)oppure almeno 4 cps al dì da 500 mg

Lattoferrina 200 una cps mattina mezzodì e sera

Alfattoalbumina 250 mg mattina mezzodì e sera.

Betotal una cps al mattino a colazione con ***Neuraben*** 1 cps

(Se neuropatie, nevralgie, parestesie)

Esteri fosforici del gruppo B a biodisponibilità elevata (in commercio **Fosforilasi**) due fiale nella stessa siringa intramuscolo a giorni alterni per almeno 3 settimane , ripetere al bisogno. Questi esterifosforici del gruppo B agiscono direttamente su virus neurotropi come l'Herpes Zoster inibendone replicazione e neurotossicità , con rapida remissione della sintomatologia nevralgica. Con analogo meccanismo biomolecolare contrastano l'iposmia e ageusia prodotte dalla neurotossicità del Covid 19 .

Vitamina B12, fiale intramuscolari da 5000 microgrammi (in commercio **Dobetin** o analoghi) una fiala intramuscolo la settimana per 3 settimane associata al **Fosforilasi** per integrarne e potenziarne l'effetto neurotrofo.

Lievito di birra alimentare , tenere in frigo, iniziare con un fettina molto sottile da diluire in acqua e zucchero, almeno 15 minuti prima del pasto, nell'arco di due settimane aumentare gradualmente fino a 5 grammi, con cui continuare a tempo indeterminato. Incrementa notevolmente l'immunità innata per l'elevato contenuto in Beta Glucani delle cellule del lievito, i saccaromiceti. Elimina germi patogeni dalla flora batterica intestinale, migliorando l'assimilazione differenziale da parte delle cellule epiteliali dei villi intestinali e una sintesi e assimilazione del gruppo B, essenziale per le catene metaboliche.

(Se cardiopatie, astenia, affaticamento)

si possono aggiungere a Fosforilasi e Dobetin prodotti biologici che intervengono direttamente migliorando la quota energetica e la funzionalità cardio muscolare:

Taurina cps 500 mg+ **Ubidecarenone** 50 mg una cps per pasto 3 al dì , dosaggio raddoppiabile al bisogno.

Carnitene fl orali 2 gr una al mattino a colazione .

(Se tosse, broncospasmo, affanno)

aereosol con **Glutazione ridotto C4** 24 mg diluito con 3 ml di fisiologica fino a remissione dei sintomi. In totale assenza di controindicazioni può intervenire limitando i danni di autoanticorpi da vaccino su due proteine del tensioattivo polmonare migliorando la funzionalità respiratoria.

Acetilcisteina 400 mg al dì per due settimane , dosi superiori e prolungate possono indurre effetto paradossale con eccessiva produzione di secrezioni e fluidificazione. Può essere utile per l'idrolisi dei legami disolfuro della proteina Spyke .

Ovviamente non posso riportare in questo contesto l'ampia letteratura, i meccanismi d'azione biomolecolari noti, le evidenze scientifiche che documentano i fondamentali effetti terapeutici di queste molecole biologiche comuni alla prevenzione e cura delle malattie infettive e oncologiche. Questi dati sono già riportati nel sito www.metododibella.org, ma verranno integrati nel corso dell'anno nella riedizione aggiornata del libro sulla prevenzione dei tumore "*La scelta antitumore...*" che comprenderà anche in forma più completa e dettagliata tutte le indagini prevaccinali, e relative terapie, cure post vaccinali per eventuali complicazioni, prevenzione e cura di malattie infettive e del Covid

Cenni sintetici di prevenzione comportamentale e farmacologica del Covid sono già reperibili nella prima pagina del sito www.metododibella.org alla sezione

Novità e Comunicazioni [Sinergismo antinfettivo e antitumorale di molecole MDBCovid-19 : PREVENZIONE ANTI-VIRALE \(documentazione e riscontri bibliografici\)](#)

Per contenere e contrastare possibili deficit immunitari potenzialmente anche fatali, l'attivazione patologica di citochine e la formazione e precipitazione di immunocomplessi della pseudoallergia mediata dal complemento, di danni all'immunità cellulo-mediata, (come nella reazione avversa definita ADE) si è rivelato particolarmente utile e tollerata l'associazione di alte dosi di MLT e altri componenti del MDB, alla somministrazione intramuscolare di immunoglobuline, 5 ml per 2 giorni, la terza dopo una settimana, con rapida remissione della malattia febbrile e recupero della omeostasi immunitaria. Le immunoglobuline non sono reperibili in Italia ma solo all'estero. L'immediata efficacia ripetutamente e regolarmente verificata è probabilmente legata all'omologia di sequenze dei virus Sars 1-2 con tanti virus respiratori, adenovirus rinovirus comunemente diffusi nell'ambiente. Pertanto le immunoglobuline, oltre a intervenire direttamente inibendo reazioni immunitarie deviate, patologiche, agiscono direttamente sul Sars 2 Covid 19 molto probabilmente con anticorpi sterilizzanti, come quelli del siero iperimmune del compianto Prof De Donno, diversamente da quelli imperfetti, non sterilizzanti e di modesta efficacia e breve durata, prodotti dai vaccini.

Giuseppe Di Bella